

Muži o inkontinenci mlčí častěji než ženy

Než aby navštívili lékaře, používají některí muži při nechtěném úniku moči raději dámské vložky, říká profesor Tomáš Hanuš, přednosta Urologické kliniky pražské Všeobecné fakultní nemocnice.

ZDENA LACKOVÁ

LN O inkontinenci se moc nemluví, a když už ano, pak o té ženské. Ale co muži?

Pokud je ženská inkontinence téměř tabu, tak mužská tím více. Chlapi nejsou tak otevření jako ženy, víc se studí a snaží se nepřipouštět si takový problém, protože by tím utrpělo jejich mužství.

LN Inkontinence u mužů ale asi není tak častá jako u žen...

Absolutní číslo výskytu nechtěného úniku moči je vyšší u žen, na druhé straně počty diagnostik s poruchou udržení moči narůstají i u mužů, jak se postupně tato problematika ve společnosti rozkrývá.

Také přibývá zhoubných nádorů prostaty a po jejich operacích či ozařování může v určitém, i když

nevelkém procentu být důsledkem porucha udržení moči.

V téchto případech se jedná o inkontinenici stresovou, způsobenou tlakem na oslabený svěrač močové trubice. Ovšem existuje rovněž mnoho závažných onemocnění postihujících i ženy, ale leckdy ve větší míře muže, která doprovází inkontinence způsobená takzvanými neurogenními příčinami.

LN Co to znamená?

Jedná se o poruchu procesu močení kvůli špatné nervové koordinaci. Močení neboli mikse je složitý děj. Jeho řízení se účastní mozek, mozková kůra, nervové dráhy se přepojují v mezimozku a hlavní centrum koordinace je pak v míše, na přechodu její hrudní a bederní části.

Důležitý je i úsek periferních nervů, které vystupují z míchy a vedou k vlastnímu orgánu, k močovému měchýři a močové trubici. Je to tedy několik poschodi, na nichž je mikní akt kontrolován. A kdekoliv v těchto místech může vzniknout problém.

Inkontinence se proto může objevit po úrazech hlavy, po krvácení do mozku, u nádoru mozku či míchy. Porucha močení může přinést i „obyčejný zánět mozku“, třeba po přiušnicích.



Tomáš Hanuš

FOTO ARCHIV

LN Určitě sem patří i vozíčkaři.

Ano, inkontinence po úrazech míchy při autonehodách či adrenalínových sportech je právě především mužskou doménou. Ale ani tím výčet neurogenních příčin nekončí. Patří sem i problémy s močením u pacientů s roztroušenou sklerózou, po centrální mozkové příhodě nebo při diabetické neuropatií.

LN Není zvětšená prostatica a s ní spojená inkontinence ve srovnání s výše zmíněnými chorobami vlastně „banálním“ problémem?

Určitě ne. Když má muž zvětšenou prostatu, obkružující močovou trubici, hrozí, že se jeho močové cesty postupně zcela uzavřou. Moč

z přeplněného močového měchýře pak paradoxně uniká, ale jen odkapává po kapkách a nelze ji normálně vyprázdnit.

Tento zbytek moči v měchýři je jednak rezervoárem pro vznik infekcí, jednak může zvětšený močový měchýř lidově řečeno tlačit na ledviny. Vzniká takzvaný reflux, kdy se moč vrací z měchýře zpět nahoru, rozšiřuje se močové cesty a poškozuje funkce ledvin.

To je dost závažné a je třeba muže vycvirkovat, tedy umožnit vyprázdnování moči za pomoci zavedené cévky přes močovou trubici. Toto řešení ostatně zachraňuje lidem život u rady chorob, které zabraňují normálnímu vymočení, což může vzniknout například při krvácení nebo při nádoru centrální nervové soustavy.

LN Ráda mužů trpí lehkou inkontinenční, která je neohrožuje na životě, ale snižuje jeho kvalitu. Přesto nemají chut svřeťovat se lékaři...

Ať už muž musí často močit, běhají na toaletu v noci, nebo trpí projevy urgencie, tedy nutení na močení, když je proud jejich moči oslaben nebo musí tlačit, aby se vůbec vymočili – prostě v žádném případě tyto příznaky neměli bagatelizovat a měli by k urologovi vyrazit. Příčinou může být zánět močových

cest nebo třeba nezhoubné zvětšení prostaty.

Obojo je třeba léčit, neboť hrozí až zástava močení. Měli jsme u nás na klinice pacienty, kteří si museli povolovat kalhoty, protože jim tak rostli obvod pasu, že je nemohli dopnout. Nebylo to ale kvůli tloušťce, jak si myslí. Měli tak velký objem močového měchýře, který nedokázal vyprázdnit. Když jsme jim z něj vypustili litr a půl či dva litry moči, najednou „zhubli“.

LN Jestliže se o úniku moči mluví málo, o inkontinenci stolice se záryte mlčí. Léčíte i tyto pacienty?

Tato léčba nespadá do rukou urologů, nýbrž chirurgů – protokologů. Ale setkáváme se s takovými pacienty a pacientkami, protože v nejtěžších případech inkontinence dochází k úniku moči i stolice. Když byla v USA snaha zavést odbornost pánevního chirurga, který by řešil obě inkontinence. V Evropě se to neujalo, ale dokládá to specifickost problému.

Při vzniku inkontinence stolice je mnoho – od vrozeného snížené kvality svalové a pojivové tkáně pánevního dna přes porodní traumatizaci až po prolapsy nebo výhryzy částí orgánů – dělohy, střeva – do pochvy. Neschopnost udržet stolici může stejně jako v případě inkontinence moči způsobit porucha nervového řízení nebo jsou na vině nádory, úrazy či operace na konečníku. Lékaři se svých pacientů málo ptají, zda netrpí kromě úniku moči i únikem stolice, takže je tento problém dosud poddiagnostikován.

Jsou důležité. I muži potřebují mít pevné svalstvo pánevního dna. Největší význam mají tyto cviky po operacích na prostatě, protože díky této rehabilitaci se zkracuje přechodná doba úniku moči a snižuje se i riziko jeho vzniku.

LN Jestliže se o úniku moči mluví málo, o inkontinenci stolice se záryte mlčí. Léčíte i tyto pacienty?

Tato léčba nespadá do rukou urologů, nýbrž chirurgů – protokologů. Ale setkáváme se s takovými pacienty a pacientkami, protože v nejtěžších případech inkontinence dochází k úniku moči i stolice. Když byla v USA snaha zavést odbornost pánevního chirurga, který by řešil obě inkontinence. V Evropě se to neujalo, ale dokládá to specifickost problému.

Při vzniku inkontinence stolice je mnoho – od vrozeného snížené kvality svalové a pojivové tkáně pánevního dna přes porodní traumatizaci až po prolapsy nebo výhryzy částí orgánů – dělohy, střeva – do pochvy. Neschopnost udržet stolici může stejně jako v případě inkontinence moči způsobit porucha nervového řízení nebo jsou na vině nádory, úrazy či operace na konečníku. Lékaři se svých pacientů málo ptají, zda netrpí kromě úniku moči i únikem stolice, takže je tento problém dosud poddiagnostikován.